

**M/S : médecine sciences**

# Prédiction de la réponse à l'Iressa<sup>®</sup> : un mécanisme inattendu Selection of patients responsive to Iressa<sup>®</sup>



Benjamin Besse, Thierry Le Chevalier and Jean-Charles Soria

Volume 20, Number 8-9, août–septembre 2004

URI: <https://id.erudit.org/iderudit/008977ar>

[See table of contents](#)

Publisher(s)

SRMS: Société de la revue médecine/sciences  
Éditions EDK

ISSN

0767-0974 (print)  
1958-5381 (digital)

[Explore this journal](#)

Cite this article

Besse, B., Le Chevalier, T. & Soria, J.-C. (2004). Prédiction de la réponse à l'Iressa<sup>®</sup> : un mécanisme inattendu. *M/S : médecine sciences*, 20(8-9), 750–751.

Tous droits réservés © M/S : médecine sciences, 2004

This document is protected by copyright law. Use of the services of Érudit (including reproduction) is subject to its terms and conditions, which can be viewed online.

<https://apropos.erudit.org/en/users/policy-on-use/>

**érudit**

This article is disseminated and preserved by Érudit.

Érudit is a non-profit inter-university consortium of the Université de Montréal, Université Laval, and the Université du Québec à Montréal. Its mission is to promote and disseminate research.

<https://www.erudit.org/en/>

## Prédiction de la réponse à l'Iressa® : un mécanisme inattendu

Benjamin Besse, Thierry Le Chevalier, Jean-Charles Soria

➤ Un vent nouveau souffle sur l'oncologie médicale depuis que le concept de thérapie moléculaire ciblée (TMC) a été validé dans la leucémie myéloïde chronique (LMC). Ce modèle de développement thérapeutique a suivi une chronologie intéressante: mise en évidence d'une translocation spécifique de la maladie (chromosome philadelphie) puis d'une protéine hybride transformante pour la cellule (bcr-abl), identification de l'activité tyrosine kinase de cette protéine et synthèse d'un antagoniste (imatinib), efficace et bien toléré en préclinique, conduisant à des résultats spectaculaires dans les essais de phase III avec l'induction de rémissions

(→) m/s  
2000, n°5,  
p. 704

complètes de longue durée chez les patients [1] (→).

Malheureusement, rares sont les tumeurs solides de l'adulte dans lesquelles des anomalies aussi précoces et fondamentales que le chromosome philadelphie de la LMC sont identifiées. Le développement des TMC est, dans ce domaine, plus lent et moins significatif et leur efficacité souvent liée à un paramètre clé: la sélection des malades sensibles. Ainsi le trastuzumab (Herceptin®), un anticorps ayant obtenu l'AMM (autorisation de mise sur le marché) pour le traitement du cancer du sein métastatique, n'est efficace qu'en cas de surexpression par les cellules tumorales du récepteur qu'il cible, HER2.

Le cancer bronchique dans sa forme non à petites cellules (CBNPC) est le cancer le plus meurtrier chez l'homme en France [2]. Le rôle de la chimiothérapie est

majeur, dans la prise en charge des patients atteints de cancers avancés (soit 85% des cas) comme dans le traitement adjuvant des patients opérés [3]. Cependant, les schémas actifs de chimiothérapie conventionnelle sont équivalents en terme d'efficacité, et c'est vers les TMC que se porte ici aussi l'espoir de franchir un palier thérapeutique important [4]. Le récepteur du facteur de croissance épidermique (EGFR ou HER1), surexprimé dans 40 à 80% des CBNPC, a très tôt été considéré comme une cible thérapeutique d'intérêt et il a fait l'objet de développement de nombreuses molécules de type TMC [5]. Les avancées les plus sensibles concernent deux principales stratégies de blocage de l'EGFR: structurelle, par un anticorps (par exemple le cetuximab), ou fonctionnelle par un inhibiteur de son activité tyrosine kinase comme le gefitinib (Iressa®).

Le gefitinib a cristallisé les espoirs et les doutes sur l'efficacité des TMC dans les tumeurs solides [6]. Initialement, deux grandes études de phase II ont montré que le gefitinib en monothérapie était efficace chez un nombre limité de patients prétraités (19% pour l'étude japonaise, et 12% dans la population caucasienne de la seconde étude) mais parfois de façon spectaculaire et ce, même en troisième ligne thérapeutique [7, 8]. Environ 30% des patients présentent une stabilisation de leur maladie associée à une amélioration symptomatique. La faible proportion de patients sensibles au gefitinib explique en partie l'échec des études de phase III; celles-ci

Département de Médecine A,  
Institut Gustave Roussy,  
39, rue Camille Desmoulins,  
94800 Villejuif, France.  
[soria@igr.fr](mailto:soria@igr.fr)

n'ont pas montré de bénéfice en terme de survie à l'adjonction du gefitinib aux schémas de chimiothérapie conventionnelle validés pour les CBNPC avancés [9, 10].

Un profil clinique et pathologique des patients répondeurs au gefitinib a pu être établi (sexe féminin, absence de tabagisme, adénocarcinome). De façon surprenante, la surexpression de l'EGFR n'est pas un facteur prédictif de réponse au gefitinib, et aucune corrélation n'a pu être faite avec l'expression ou l'activation des relais intracellulaires d'EGFR. La définition d'un profil biologique de sensibilité passait peut-être par une étude qualitative et non pas quantitative de l'EGFR, comme le suggèrent deux études récentes [11, 12].

J.G. Paez *et al.* ont séquencé le récepteur EGFR dans 119 tumeurs pulmonaires primitives [12]. Ils ont mis en évidence 16 mutations hétérozygotes, toutes dans une région située entre les exons 18 à 21, correspondant à la portion portant l'activité kinase de l'EGFR. Ces mutations (faux-sens ou délétion) étaient absentes dans le tissu sain adjacent, confirmant leur nature somatique. Pour les auteurs, la mutation du récepteur EGFR conférerait une sensibilité au gefitinib sur trois arguments:

- l'analyse des tumeurs de neuf patients ayant reçu du gefitinib: seuls les cinq patients répondeurs présentaient une mutation de l'EGFR;
- une étude cellulaire associée: une mutation n'a été identifiée que dans une lignée sensible au gefitinib, et non dans trois autres lignées résistantes;
- la distribution des mutations chez les 119 patients, qui est très cohérente avec le profil clinico-pathologique connu de



la population sensible: les mutations furent plus fréquentes dans les adénocarcinomes (21% contre 2% pour le reste des tumeurs), chez les femmes que les hommes (20% contre 9%) et dans l'ethnie japonaise que caucasienne (26% contre 3%).

On pourra noter que la fréquence des carcinomes bronchiolo-alvéolaires, qui représentent un sous-type histologique rare mais très sensible au gefitinib, n'est pas rapportée dans cette étude.

Dans un second travail publié dans le *New England Journal of Medicine*, neuf tumeurs de patients ayant répondu au gefitinib ont été étudiées [11]. Une mutation hétérozygote a été détectée dans huit cas, située également dans la portion codant pour l'activité kinase de l'EGFR; elle n'était pas retrouvée dans le tissu sain adjacent dans les quatre tumeurs où il a pu être analysé. Ces neuf patients étaient essentiellement des femmes n'ayant jamais fumé, dont les tumeurs étaient soit un adénocarcinome (cinq cas), soit un carcinome bronchiolo-alvéolaire (quatre cas). Les auteurs ont étendu la recherche de mutation à 25 autres cas de cancer du poumon (non traités par gefitinib) et mis en évidence une mutation dans deux cas de carcinome bronchiolo-alvéolaire. En revanche, aucune mutation ne fut détectée dans 95 tumeurs primaires (15 cancers du sein, 20 cancers du côlon, 16 cancers du rein, 40 cancers du pancréas et quatre cancers du système nerveux central) et 108 lignées cellulaires (11 origines tumorales différentes). Les auteurs ont complété ce travail en transfectant l'ADNc codant pour deux récepteurs mutés dans des cellules Cos-7. Les

cellules transfectées avec les récepteurs EGFR mutés ont présenté une activation par l'EGF plus marquée et une sensibilité accrue au gefitinib par rapport aux cellules témoins, exprimant un EGFR sauvage.

Ces deux publications suggèrent qu'une mutation de la protéine kinase de l'EGFR serait un facteur prédictif de sensibilité au gefitinib. La proportion des patients dont la tumeur présente une mutation dans l'ensemble de la population des malades reste faible (3 à 8% chez les Caucasiens, 26% chez les Japonais) mais est relativement cohérente avec les pourcentages publiés de patients répondeurs au gefitinib; elle reste importante rapportée au nombre de patients atteints de CBPNC. Ces données doivent rester uniquement indicatives, elles peuvent être biaisées par le faible nombre des tumeurs étudiées et leur type histologique. Elles nécessitent d'être confirmées par des études prospectives, qui devront répondre à d'autres questions en suspens: quelle est l'influence de ces mutations sur les autres inhibiteurs de l'activité protéine kinase de l'EGFR et sur les anticorps développés contre l'EGFR? Quel est le statut des patients qui présentent une réponse symptomatique importante et une stabilisation tumorale? D'autres études plus fondamentales pourront peut-être préciser pourquoi ces mutations semblent plus spécifiques d'un sous type histologique, et plus fréquentes chez certaines ethnies. Ces résultats donnent une nouvelle dimension au développement de gefitinib qui pourrait, chez les patients sélectionnés, être introduit très tôt dans la séquence

thérapeutique et peut être modifier plus significativement l'histoire de la maladie. ♦

### Selection of patients responsive to Iressa®

#### RÉFÉRENCES

1. Druker BJ, Talpaz M, Resta DJ, et al. Efficacy and safety of a specific inhibitor of the Bcr-Abl tyrosine kinase in chronic myeloid leukemia. *N Engl J Med* 2001; 344: 1031-7.
2. Hill C, Doyon F. Frequency of cancer in France: 2004 update. *Bull Cancer* 2004; 91: 9-14.
3. IALT. Cisplatin-based adjuvant chemotherapy in patients with completely resected non-small-cell lung cancer. *N Engl J Med* 2004; 350: 351-60.
4. Schiller JH, Harrington D, Belani CP, et al. Comparison of four chemotherapy regimens for advanced non-small-cell lung cancer. *N Engl J Med* 2002; 346: 92-8.
5. Arteaga CL. ErbB-targeted therapeutic approaches in human cancer. *Exp Cell Res* 2003; 284: 122-30.
6. Fayette J, Soria JC. Thérapies moléculaires ciblées: l'exemple de l'Iressa® (ZD1839). *Med Sci (Paris)* 2003; 19: 1052-4.
7. Kris MG, Natale RB, Herbst RS, et al. Efficacy of gefitinib, an inhibitor of the epidermal growth factor receptor tyrosine kinase, in symptomatic patients with non-small cell lung cancer: a randomized trial. *JAMA* 2003; 290: 2149-58.
8. Fukuoka M, Yano S, Giaccone G, et al. Multi-institutional randomized phase II trial of gefitinib for previously treated patients with advanced non-small-cell lung cancer. *J Clin Oncol* 2003; 21: 2237-46.
9. Herbst RS, Giaccone G, Schiller JH, et al. Gefitinib in combination with paclitaxel and carboplatin in advanced non-small-cell lung cancer: a phase III trial-INTACT 2. *J Clin Oncol* 2004; 22: 785-94.
10. Giaccone G, Herbst RS, Manegold C, et al. Gefitinib in combination with gemcitabine and cisplatin in advanced non-small-cell lung cancer: a phase III trial-INTACT 1. *J Clin Oncol* 2004; 22: 777-84.
11. Lynch TJ, Bell DW, Sordella R, et al. Activating mutations in the epidermal growth factor receptor underlying responsiveness of non-small-cell lung cancer to gefitinib. *N Engl J Med* 2004; 350: 2129-39.
12. Paez JG, Janne PA, Lee JC, et al. EGFR mutations in lung cancer: correlation with clinical response to gefitinib therapy. *Science* 2004; 304: 1497-500.