

M/S : médecine sciences



Le gène codant pour l'I-BABP est-il impliqué dans l'homéostasie du cholestérol?

Is the ileal bile acid-binding protein (I-BABP) gene involved in cholesterol homeostasis?

Philippe Besnard, Jean-François Landrier, Jacques Grober et Isabelle Niot

Volume 20, numéro 1, janvier 2004

URI : <https://id.erudit.org/iderudit/007524ar>

[Aller au sommaire du numéro](#)

Éditeur(s)

SRMS: Société de la revue médecine/sciences
Éditions EDK

ISSN

0767-0974 (imprimé)
1958-5381 (numérique)

[Découvrir la revue](#)

Citer cet article

Besnard, P., Landrier, J.-F., Grober, J. & Niot, I. (2004). Le gène codant pour l'I-BABP est-il impliqué dans l'homéostasie du cholestérol? *M/S : médecine sciences*, 20(1), 73–77.


Résumé de l'article

La réabsorption intestinale des acides biliaires joue un rôle prépondérant dans le maintien de l'homéostasie du cholestérol. En effet, la perte fécale des acides biliaires constitue une importante voie d'élimination physiologique du cholestérol. L'I-BABP (*ileal bile acid-binding protein*) est un polypeptide soluble largement exprimé dans les cellules absorbantes de l'intestin grêle distal, connues pour être le siège d'une réabsorption active extrêmement efficace des acides biliaires. Des résultats récents démontrent que l'expression du gène codant pour l'I-BABP est profondément influencée par les concentrations d'acides biliaires et de cholestérol. Cette régulation requiert l'intervention de facteurs de transcription (FXR, LXR, SREBP) dont on sait qu'ils jouent un rôle homéostatique crucial dans le métabolisme lipidique, en général, et dans celui du cholestérol, en particulier. Ces observations inédites suggèrent que l'expression du gène de l'I-BABP intervient dans le devenir des acides biliaires et du cholestérol à l'échelle de l'organisme.

> La réabsorption intestinale des acides biliaires joue un rôle prépondérant dans le maintien de l'homéostasie du cholestérol. En effet, la perte fécale des acides biliaires constitue une importante voie d'élimination physiologique du cholestérol. L'I-BABP (*ileal bile acid-binding protein*) est un polypeptide soluble largement exprimé dans les cellules absorbantes de l'intestin grêle distal, connues pour être le siège d'une réabsorption active extrêmement efficace des acides biliaires. Des résultats récents démontrent que l'expression du gène codant pour l'I-BABP est profondément influencée par les concentrations d'acides biliaires et de cholestérol. Cette régulation requiert l'intervention de facteurs de transcription (FXR, LXR, SREBP) dont on sait qu'ils jouent un rôle homéostatique crucial dans le métabolisme lipidique, en général, et dans celui du cholestérol, en particulier. Ces observations inédites suggèrent que l'expression du gène de l'I-BABP intervient dans le devenir des acides biliaires et du cholestérol à l'échelle de l'organisme. <

Le gène codant pour l'I-BABP est-il impliqué dans l'homéostasie du cholestérol ?

Philippe Besnard, Jean-François Landrier, Jacques Grober, Isabelle Niot



revue, voir [1]), les informations concernant les acteurs de leur réabsorption intestinale sont en revanche plus rares.

Laboratoire de physiologie de la nutrition, École nationale supérieure de biologie appliquée à la nutrition et à l'alimentation (ENSBANA), UMR 5170-CESG Cnrs/INRA/Université de Bourgogne, 1, esplanade Érasme, 21000 Dijon, France. pbesnard@u-bourgogne.fr

Vers un décryptage progressif du transport intestinal des acides biliaires

La réabsorption des acides biliaires s'effectue le long de l'intestin grêle par l'intermédiaire de différents mécanismes complémentaires (Figure 1). Alors que la réabsorption des acides biliaires non conjugués se fait par simple diffusion, celle des acides biliaires conjugués requiert la présence de transporteurs membranaires plus ou moins spécifiques, dont l'existence au pôle apical des entérocytes est de découverte récente (pour revue, voir [3]). Au-delà de la participation de l'*organic anion transport protein 3* (OATP3) [4, 5] aux niveaux jéjunal et iléal, l'essentiel de la recapture des acides biliaires s'effectue par l'intermédiaire d'un transport actif strictement iléal. Il s'agit d'un phénomène complexe impliquant des protéines membranaires et solubles présentant une spécificité et une affinité fortes pour les acides biliaires conjugués di- et trihydroxylés (Figure 2). Dans la bordure en brosse de l'iléocyte, les acides biliaires sont pris en

Le maintien d'un réservoir de cholestérol dans l'organisme dépend de l'ajustement permanent des pertes (utilisation cellulaire et élimination fécale sous forme native et d'acides biliaires) aux apports (alimentation et synthèse endogène). On sait que le foie et l'intestin jouent un rôle prépondérant et complémentaire dans l'homéostasie du cholestérol: ainsi, la bioconversion hépatique du cholestérol en acides biliaires, puis la régulation de la réabsorption intestinale des acides biliaires sont des mécanismes essentiels au maintien de l'homéostasie du cholestérol. Si la régulation des gènes codant pour les enzymes clés de la biosynthèse hépatique des acides biliaires a largement été étudiée (pour

charge par l'intestinal bile acid-transporter (I-BAT), une protéine membranaire également appelée *apical sodium-dependent bile acid transporter* (ASBT) [6]. Chez l'homme, certaines mutations du gène codant pour l'I-BAT entraînent une malabsorption sévère des acides biliaires qui est à l'origine de profondes perturbations du métabolisme lipidique [7].

Une fois dans la cellule, les acides biliaires sont pris en charge avec une affinité et une spécificité importantes par l'*ileal bile acid-binding protein* (I-BABP), également dénommée *ileal lipid-binding protein* (ILBP), une protéine soluble de 15 kDa dont l'ADNc a été cloné dans de nombreuses espèces, notamment chez l'homme [8]. Enfin, les acides biliaires sont sécrétés dans la circulation portale par l'intermédiaire d'au moins deux transporteurs localisés au niveau de la membrane basolatérale de l'iléocyte: la *multidrug resistance protein 3* (MRP3) et tI-BAT, une forme tronquée de l'I-BAT (pour revue, voir [9]).

L'I-BABP: une protéine en quête de fonctions

Bien que le rôle physiologique de l'I-BABP ne soit pas encore clairement établi, ses propriétés de liaison des acides biliaires, son abondance et sa localisation iléale [10-13] suggèrent qu'elle intervient dans la capture et le transport des acides biliaires depuis la membrane apicale vers la membrane basolatérale de l'iléocyte (Figure 2). Dans ce cas, on peut penser que le niveau d'expression de cette protéine retentit sur l'efficacité du recyclage des acides biliaires, et joue un rôle critique dans l'homéostasie du cholestérol.

Des acides biliaires inducteurs de gènes

La première démonstration du contrôle de l'expression de l'I-BABP par un facteur biliaire a été obtenue en réalisant une dérivation iléale chez le rat [14], dans l'objectif d'isoler *in situ* l'iléon distal. L'absence chronique de bile conduit à une chute de l'expression de l'I-BABP (ARNm et protéine), tandis que l'instillation répétée de bile l'induit fortement. Cette régulation est directe, puisque qu'elle a pu être reproduite *in vitro* sur des explants iléaux de rat et sur des cellules humaines de type entérocytaire de la lignée Caco-2 [14]. Les acides biliaires sont les seuls composés de la bile à avoir cet effet inducteur sur l'expression de l'I-BABP; celui-ci est dépendant de la structure des acides biliaires, les composés les plus hydrophobes (acides chénodésoxycholique et désoxycholique) étant les inducteurs les plus puissants [15].

En ce qui concerne le mécanisme moléculaire de cette induction, il a été démontré que les acides biliaires sont des ligands et des activateurs physiologiques du *farnesoid-X-receptor* (FXR) [16-18], un récepteur nucléaire jusqu'alors orphelin. Par ailleurs, une colocalisation stricte a

été démontrée chez la souris entre le FXR et l'I-BABP [19], ce qui conforte l'hypothèse d'une relation fonctionnelle entre ces deux protéines. Des expériences de retard de migration sur gel et de transfections transitoires de cellules Caco-2 ont permis d'établir que le FXR, une fois hétérodimérisé avec le RXR (*retinoid-X-receptor*), reconnaît une séquence de réponse spécifique, baptisée *bile acid-responsive element* (BARE), responsable de la transactivation du promoteur humain de l'I-BABP par les acides biliaires (Figure 3) [19].

Le gène codant pour l'I-BABP: une cible des stérols

Une régulation directe du gène codant pour l'I-BABP par le cholestérol peut également être envisagée. L'hypothèse formulait qu'un excès de cholestérol conduit à une répression de l'expression du gène codant pour l'I-BABP, afin de réduire la réabsorption des acides




Figure 1. Cycle entérohépatique des acides biliaires. Les acides biliaires (AB) sont synthétisés dans le foie à partir du cholestérol (CS). Après conjugaison avec la glycine ou la taurine, les acides biliaires (ABc) sont sécrétés dans la bile, puis stockés dans la vésicule biliaire. Après une prise alimentaire, les acides biliaires se retrouvent dans la lumière duodénale où ils participent à la digestion et à l'absorption des graisses alimentaires. Plus de 95% des acides biliaires déversés dans l'intestin sont réabsorbés grâce à trois mécanismes complémentaires: diffusion passive, transport facilité et transport actif. Sous forme liée à l'albumine (Alb), ils regagnent le foie par la voie portale avant d'être sécrétés de nouveau dans la bile. Ce cycle entérohépatique intervient six à dix fois par jour chez l'homme sain. La synthèse hépatique des acides biliaires, sous le contrôle principal de la cholestérol 7 α hydroxylase (CYP7A1), compense les pertes fécales. AC: acide cholique; ACDC: acide chénodésoxycholique; ADC: acide désoxycholique; ALC: acide lithocholique.

biliaires et d'augmenter leur excrétion fécale. L'activité transcriptionnelle des *sterol-responsive element-binding proteins* (SREBP) étant dépendante de la concentration intracellulaire de cholestérol, l'implication de ce type de facteurs de transcription dans ce schéma régulateur était probable.

Des souris ont donc été soumises de façon chronique à un régime fortement enrichi en cholestérol. De façon inattendue, compte tenu de l'hypothèse de travail, ce changement nutritionnel s'est accompagné d'une augmentation des concentrations d'ARNm de l'I-BABP dans l'iléon. Une approche *ex vivo* réalisée sur les explants iléaux a permis d'écartier la possibilité que cet effet soit lié à une augmentation de la production d'acides biliaires après induction de la CYP 7A1 (cholestérol 7 α -hydroxylase) par le cholestérol [20]. Une série d'expériences réalisées chez des souris traitées avec un agoniste pharmacologique spécifique du LXR α (*liver X receptor* α), le GW3965, a en fait permis d'aboutir à la conclusion qu'une surcharge alimentaire en cholestérol, et donc l'augmentation de la concentration cellulaire en oxystérols, induit une augmentation de l'expression de l'I-BABP *via* une cascade d'événements incluant la régulation de SREBP1c par le LXR [20] (Figure 3). Une

régulation directe *via* la fixation de LXR sur le BARE vient également d'être démontrée [21].

I-BABP et homéostasie du cholestérol

Si la fonction physiologique précise de l'I-BABP est toujours incertaine [22], l'étroite régulation de l'expression de son gène par le cholestérol, les acides biliaires et les oxystérols, *via* des acteurs transcriptionnels (FXR, LXR, SREBP1c) qui sont autant de détecteurs cellulaires de stérols, suggère que ce gène pourrait jouer un rôle important dans l'homéostasie du cholestérol. L'intégration de l'I-BABP dans un schéma régulateur plus global fait ressortir une possible implication de cette protéine dans deux événements dont l'impact dans l'homéostasie du cholestérol n'est pas négligeable: le maintien de l'intégrité de la muqueuse iléale et la modulation de la perte fécale du cholestérol (Figure 4).

La surcharge alimentaire en cholestérol s'accompagne d'une augmentation de la synthèse d'acides biliaires et d'oxystérols, ces modifications provoquant à leur tour une forte induction de l'expression du gène codant pour l'I-BABP, *via* les voies FXR et LXR/SREBP1c. Cette induction aboutit à une augmentation de la capacité de liaison des acides biliaires au niveau de l'iléocyte, qui contribue au maintien de l'intégrité

de la muqueuse iléale¹, indispensable au bon déroulement du cycle entérohépatique des acides biliaires, et de ce fait à l'homéostasie du cholestérol.

Un rôle indirect de l'I-BABP dans l'élimination fécale du cholestérol est également envisageable. Cette hypothèse fait appel à l'implication conjointe de transporteurs membranaires responsables de l'efflux cellulaire du cholestérol, les *ATP-binding cassette* G-5 et G-8 (ABCG-5 et -8) [24]. Il a récemment été montré que l'expression des gènes codant pour ces protéines est sous le contrôle de LXR, et l'induction simultanée de l'expression de l'I-BABP, de l'ABCG-5 et de l'ABCG-8 consécutive à une charge en cholestérol pourrait se traduire au niveau de l'iléocyte par une augmentation conjointe de la réabsorption des acides biliaires et de l'efflux du cholestérol. Ces flux cellulaires opposés, provoquant le déséqui-




Figure 2. Transport actif des acides biliaires au niveau iléal. L'essentiel de la recapture intestinale des acides biliaires s'effectue par l'intermédiaire d'un transport actif strictement iléal. La capture apicale des acides biliaires conjugués (ABc) ou non (AB) nécessite un cotransport sodium/acides biliaires dépendant de l'ATP et assuré par l'*intestinal bile acid transporter* (I-BAT). Ce système est complété par une protéine membranaire peu spécifique, l'*organic anion transport protein 3* (OATP3). Une fois dans l'iléocyte, les acides biliaires sont liés de façon réversible à l'*ileal bile acid-binding protein* (I-BABP). Les acides biliaires franchiraient la membrane basolatérale de l'iléocyte par l'intermédiaire de deux transporteurs membranaires dont le rôle respectif n'est pas encore clair, la *multidrug resistance protein 3* (MRP 3) et une forme tronquée de l'I-BAT (tl-BAT). Dans le sang portal, les acides biliaires sont principalement liés à l'albumine (Alb).

¹ Il est intéressant de noter que l'activation de la voie LXR/SREBP1c peut également contribuer à la protection cellulaire en limitant la quantité cellulaire de cholestérol libre. En effet, l'induction de la synthèse d'oléoyl-CoA secondaire à la régulation de l'expression de la D9 désaturase par les stérols [23] aboutit finalement à la transformation du cholestérol libre en ester de cholestérol.

libre progressif du rapport cholestérol/acides biliaires dans la lumière intestinale, devraient conduire à une chute de la solubilisation micellaire du cholestérol. La conséquence finale serait une excrétion fécale accrue de cholestérol (Figure 4), phénomène effectivement constaté chez des souris traitées avec un agoniste pharmacologique de LXR [24]. L'utilisation de modèles animaux surexprimant de façon spécifique de tissu l'I-BABP, ou à l'inverse présentant une invalidation du gène codant pour cette protéine, devrait permettre d'éprouver la pertinence de ces hypothèses fonctionnelles.

Conclusions

Le contrôle étroit de l'expression de l'I-BABP par les stérols suggère que cette protéine intestinale peut être importante pour l'homéostasie du cholestérol. S'il semble exclu que l'I-BABP joue un rôle direct et prépondérant dans la modulation de l'élimination fécale des acides biliaires, on peut raisonnablement penser que ce transporteur soluble d'acides biliaires participe au maintien efficace de la circulation entérohépatique d'acides biliaires et au contrôle de l'excrétion fécale du cholestérol. Une meilleure connaissance du transport intestinal des lipides pourrait, à terme, conduire à des actions thérapeutiques ciblées visant à corriger les dyslipidémies, dont l'incidence sur la santé n'est plus à démontrer. ♦

REMERCIEMENTS

Les travaux présentés dans cet article ont été financés par le Conseil Régional de Bourgogne et par GlaxoSmithKline.

SUMMARY

Is the ileal bile acid-binding protein (I-BABP) gene involved in cholesterol homeostasis?

In the body, cholesterol balance results from an equilibrium between supplies (diet and cellular *de novo* synthesis), and losses (cellular use and elimination in feces, essentially as bile acids). Bile acids are synthesized from cholesterol in the liver. After conjugation to glycine or taurine, bile acids are secreted with bile in the intestinal lumen where they actively participate to the digestion and absorption of dietary fat and lipid-soluble vitamins. In healthy subjects, more than 95% of bile acids are reabsorbed throughout the small intestine and returned by the portal vein to the liver, where they are secreted again into bile. This enterohepatic circulation is essential for maintenance of bile acids balance, and hence, for cholesterol homeostasis. Indeed, the bile acids not reclaimed by intestinal absorption constitute the main physiological way to eliminate a cholesterol excess. Little is known about the molecular mechanisms

controlling bile acids reabsorption by the small intestine. The intestinal bile acids uptake mainly takes place through an active transport located in the distal part of the small intestine. To date, four unrelated proteins exhibiting a high affinity for bile acids have been identified in the ileum, and only one, the ileal bile acid-binding protein (I-BABP) is a soluble protein. Therefore, it is thought to be essential for efficient bile acids desorption from the apical plasma membrane, as well as for bile acids intracellular trafficking and targeting towards the basolateral membrane. If this assumption is correct, the I-BABP expression level might be rate limiting for the enterohepatic bile acids circulation, and hence, for cholesterol homeostasis. It was found that both bile acids and cholesterol, probably *via* oxysterols, are able to up-regulate the transcription rate of I-BABP gene. The fact that intracellular sterol sensors (FXR, LXR, and SREBP1c) are involved in the control of the I-BABP gene expression strongly suggests that I-BABP exerts an important role in maintenance of cholesterol balance. ♦




Figure 3. Régulation de l'expression du gène codant pour l'I-BABP par les stérols.

Une surcharge en cholestérol s'accompagne d'une augmentation de la synthèse d'acides biliaires (AB) et d'oxystérols, à l'origine de l'activation de deux voies régulatrices aboutissant à l'induction de l'expression du gène codant pour l'I-BABP. Les acides biliaires sont des ligands et des activateurs physiologiques du récepteur nucléaire *farnesoid-X-receptor* (FXR), qui forme un hétérodimère avec le récepteur *retinoid-X-receptor* (RXR); cet hétérodimère reconnaît la séquence spécifique *bile acid responsive element* (BARE), responsable de la transactivation du promoteur du gène codant pour l'I-BABP. L'augmentation de la synthèse des oxystérols active, quant à elle, le *liver-X-receptor* (LXR), qui forme un hétérodimère avec RXR, responsable de la reconnaissance d'une séquence spécifique *LXR-responsive element* (LXRE) du gène codant pour la *sterol responsive element-binding protein 1c* (SREBP1c), dont l'expression est augmentée. SREBP1c se fixe sur une séquence *sterol responsive element* (SRE) du gène codant pour l'I-BABP et augmente son expression. LXR peut également se fixer directement sur le BARE.

RÉFÉRENCES

- Russell DW, Setchell KD. Bile acid biosynthesis. *Biochemistry* 1992; 31: 4737-49.
- Repa JJ, Mangelsdorf DJ. The role of orphan nuclear receptors in the regulation of cholesterol homeostasis. *Annu Rev Cell Dev Biol* 2000; 16: 459-81.
- Meier PJ, Stieger B. Bile salt transporters. *Annu Rev Physiol* 2002; 64: 635-61.
- Abe T, Kakyo M, Sakagami H, et al. Molecular characterization and tissue distribution of a new organic anion transporter subtype (oatp3) that transports thyroid hormones and taurocholate and comparison with oatp2. *J Biol Chem* 1998; 273: 22395-401.
- Walters HC, Craddock AL, Fusegawa H, Willingham MC, Dawson PA. Expression, transport properties, and chromosomal location of organic anion transporter subtype 3. *Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol* 2000; 279: G1188-200.
- Schneider BL, Dawson PA, Christie DM, Hardikar W, Wong MH. Cloning and molecular characterization of the ontogeny of a rat ileal sodium-dependent bile acid transporter. *J Clin Invest* 1995; 95: 745-54.
- Oelkers P, Kirby LC, Heubi JE, Dawson PA. Primary bile acid malabsorption caused by mutations in the ileal sodium-dependent bile acid transporter gene (SLC10A2). *J Clin Invest* 1997; 99: 1880-7.
- Fujita M, Fujii H, Kanda T, Sato E, Hatakeyama K, Ono T. Molecular cloning, expression, and characterization of a human intestinal 15-kDa protein. *Eur J Biochem* 1995; 233: 406-13.
- Shneider BL. Intestinal bile acid transport: biology, physiology, and pathophysiology. *J Pediatr Gastroenterol Nutr* 2001; 32: 407-17.
- Bernlohr DA, Simpson MA, Hertzell AV, Banaszak LJ. Intracellular lipid-binding proteins and their genes. *Annu Rev Nutr* 1997; 17: 277-303.
- Zimmerman AW, van Moerkerk HT, Veerkamp JH. Ligand specificity and conformational stability of human fatty acid-binding proteins. *Int J Biochem Cell Biol* 2001; 33: 865-76.
- Lucke C, Zhang F, Hamilton JA, Sacchettini JC, Ruterjans H. Solution structure of ileal lipid binding protein in complex with glycocholate. *Eur J Biochem* 2000; 267: 2929-38.
- Kramer W, Sauber K, Baringhaus KH, et al. Identification of the bile acid-binding site of the ileal lipid-binding protein by photoaffinity labeling, matrix-assisted laser desorption ionization-mass spectrometry, and nmr structure. *J Biol Chem* 2001; 276: 7291-301.
- Kanda T, Niot I, Foucaud L, et al. Effect of bile on the intestinal bile-acid binding protein (I-BABP) expression. *In vitro and in vivo* studies. *FEBS Lett* 1996; 384: 131-4.
- Kanda T, Foucaud L, Nakamura Y, et al. Regulation of expression of human intestinal bile acid-binding protein in Caco-2 cells. *Biochem J* 1998; 330: 261-5.
- Wang H, Chen J, Hollister K, Sowers LC, Forman BM. Endogenous bile acids are ligands for nuclear receptor FXR/BAR. *Mol cell* 1999; 3: 543-53.
- Parks DJ, Blanchard SG, Bledsoe RK, et al. Bile acids: natural ligands for an orphan nuclear receptor. *Science* 1999; 284: 1365-8.
- Makishima M, Okamoto AY, Repa JJ, et al. Identification of a nuclear receptor for bile acids. *Science* 1999; 284: 1362-5.
- Grober J, Zaghini I, Fujii H, et al. Identification of a bile acid-responsive element in the human ileal bile acid-binding protein gene. Involvement of the farnesoid x receptor/9-cis-retinoic acid receptor heterodimer. *J Biol Chem* 1999; 274: 29749-54.
- Zaghini I, Landrier JF, Grober J, et al. Sterol regulatory element-binding protein-1c is responsible for cholesterol regulation of ileal bile acid-binding protein gene *in vivo*. Possible involvement of liver-X-receptor. *J Biol Chem* 2002; 277: 1324-31.
- Landrier JF, Grober J, Demychuk J, Besnard P. FXRE can function as an LXRE in the promoter of human ileal bile acid-binding protein (I-BABP) gene. *FEBS Lett* 2003; 553: 299-303.
- Landrier JF, Grober J, Zaghini I, Besnard P. Regulation of ileal bile acid-binding protein gene: an approach to determine its physiological function(s). *Mol Cell Biochem* 2002; 239: 149-55.
- Repa JJ, Liang G, Ou J, et al. Regulation of mouse sterol regulatory element-binding protein-1c gene (SREBP-1c) by oxysterol receptors, LXR α and LXR β . *Genes Dev* 2000; 14: 2819-30.
- Plösch T, Kok T, Bloks VW, et al. Increased hepatobiliary and fecal cholesterol excretion upon activation of the liver-X-receptor (LXR) is independent of ABCA1. *J Biol Chem* 2002; 277: 33870-7.




Figure 4. Implications possibles de l'I-BABP dans l'homéostasie du cholestérol.

Une surcharge en cholestérol (CS) est susceptible d'entraîner au moins deux effets au niveau de différents gènes intestinaux : l'induction de l'expression de l'ileal bile acid-binding protein (I-BABP), entraînant une augmentation de la réabsorption des acides biliaires (AB) dans l'iléon (voir Figure 3), et l'augmentation, via le liver-X-receptor (LXR), de la synthèse des transporteurs membranaires ATP-binding cassette G5 et G8 (ABC-G5 et G8) responsables de l'efflux cellulaire de cholestérol. Le premier effet concourt au maintien de l'intégrité de la muqueuse iléale, tandis qu'une coordination des deux effets est susceptible d'augmenter l'élimination fécale de cholestérol, en raison du déséquilibre progressif du rapport cholestérol/acides biliaires dans la lumière intestinale et de la chute de solubilisation micellaire du cholestérol qui en résulte. FXR: farnesoid-X-receptor; SREBP1c: sterol regulatory element-binding protein1c.

TIRÉS À PART

P. Besnard